



**2017 MISE A DISPOSITION des protocoles médicaux du CHU de Rennes : filière obstétricale**

Ces protocoles mis à disposition des partenaires du réseau périnatal 35 sont fournis à titre indicatif, ils n'ont pas été validés par la direction du réseau et à ce titre n'engagent pas sa responsabilité. Les textes sont relayés *in extenso*, ils ne peuvent en aucun cas être modifiés ni diffusés hors contexte.

## **HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES**

Département de Gynécologie Obstétrique et Reproduction Humaine

**Professeur P. POULAIN**

ooooo

CREATION	PROTOCOLE GHR, BLOC, SDC	MISE A JOUR
	<b>FIEVRE ET TRAVAIL</b> page 1/1	Aout 2012

**DEFINITION = $T^{\circ} \geq 38^{\circ}$  confirmée à 1 heure d'intervalle.**

### **BILAN CLINIQUE ET PARACLINIQUE**

- ◆ NFS - CRP
- ◆ 3 Hémocultures
- ◆ ECBU
- ◆ Prélèvement vaginal et de gorge (cf. protocole « prévention strepto A »)

### **CONDUITE A TENIR**

- ◆ Amoxicilline IV 2 g puis 1 g toutes les 4 heures
- ◆ Surveiller la température toute les heures.
- ◆ ERCF en continu mais pas d'électrode de scalp.
- ◆ naissance (voie haute ou basse) dans les 6 heures, environ.
- ◆ en cas de fièvre importante (39° ou plus), paracétamol 1g/6heures per os pour prévenir les hyperthermies malignes du nv-né. Ne doit pas retarder une éventuelle décision de césarienne sous prétexte d'une baisse de la fièvre +++.



**2017 MISE A DISPOSITION des protocoles médicaux du CHU de Rennes : filière obstétricale**

Ces protocoles mis à disposition des partenaires du réseau périnatal 35 sont fournis à titre indicatif, ils n'ont pas été validés par la direction du réseau et à ce titre n'engagent pas sa responsabilité. Les textes sont relayés *in extenso*, ils ne peuvent en aucun cas être modifiés ni diffusés hors contexte.

## Après l'ACCOUCHEMENT

### ♦ Pour la mère

Antibiothérapie à poursuivre selon une administration plus classique :

**Amoxicilline** 8g par 24H par voie parentérale jusqu'à l'obtention de 48 H d'apyréxie, puis  
**Amoxicilline per os** 3 g par 24 H.

Durée totale du traitement = 10 jours minimum.

Le choix de l'antibiotique est à adapter dans un deuxième temps en cas d'antibiogramme.

**Aucun prélèvement à faire au niveau du placenta.**

En cas d'allergie à l'amoxicilline cf protocole « ATB prophylaxie en cours de grossesse »+++

- Pour l'enfant : cf. protocole « nouveau-né en maternité et infection bactérienne » par nos collègues pédiatres en néonatalogie.